

Bijsluiter

Tick Off Combispray

Tick Off

003

Tick Off Combispray, 18,8 mg/ml - 0,2 mg/ml huidspray oplossing voor honden

Permethrin
Pyriproxyfen

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Bridgefarma BV
De Limiet 15D
4131NR Vianen

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac
1^{ère} Avenue 2065 m
LID 06510 Carros
Frankrijk

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDELEN

Werkzame bestanddelen:

Per ml:	
Permethrin	18,8 mg
Pyriproxyfen	0,2 mg

Excipients tot 1 ml

INDICATIES: Behandeling en preventie van besmetting met volwassen vlooiën en teken bij honden gedurende 45 respectievelijk 30 dagen. Bescherming tegen infectie met vlooiën door remming van de ontwikkeling van het insect naar het volwassen stadium gedurende 10 weken.

CONTRA-INDICATIES: Niet gebruiken bij katten, zieke of herstellende honden, puppies jonger dan 3 maanden, zogende teven en bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN: Overgevoeligheid, spiertrillingen, ataxie, braken, convulsies en regelmatig terugkerende spiertrekkingen. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS: Hond

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG: De dosering is afhankelijk van de vachtlengte en de grootte van het dier.

Eén keer sprayen komt overeen met 3 ml.

Honden tot 20 kg: 5ml per kg lichaamsgewicht.

Honden tussen 20 - 40 kg: 3 ml per kg lichaamsgewicht.

Honden vanaf 40 kg: 100 ml per dier. Het diergeneesmiddel niet vaker dan 1x per 4 weken toedienen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING: Uitwendig op de hond toepassen. Op een afstand van 10-20 cm tegen de haarrichting in. Niet in de ogen sprayen. Masseer de vacht bij langharige dieren, zodat het diergeneesmiddel tot op de huid kan doordringen. Gebruik hierbij handschoenen. Laat het diergeneesmiddel op de vacht drogen. De hond niet droogwrijven, föhnen of borstelen en niet direct in contact laten komen met gelakte of geverfde oppervlakken.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN: Bewaren beneden 30 °C. Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Tegen direct zonlicht beschermen. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Als de knijp-spraypomp eenmaal geplaatst is, bewaar de flacon verticaal.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN: Ontvlambaar. Houd behandelde dieren weg van open vuur en andere warmtebronnen tot de vacht volledig droog is, echter tenminste gedurende 30 minuten na het sprayen. Niet in een open vlam of ander gloeiend voorwerp sprayen. Niet roken, drinken of eten wanneer u het diergeneesmiddel toedient. Spray niet in de ogen van het dier. Niet gebruiken bij katten omdat er bijwerkingen kunnen optreden en dieren zelfs dood kunnen gaan. Voorkom dat behandelde dieren zichzelf likken en, indien er meerdere dieren zijn, voorkom dat andere dieren, vooral katten, de behandelde honden likken. Vermijd bij toepassing directe inademing, alsmede direct huid- en oogcontact ter voorkoming van irritatie. Draag handschoenen en bescherm ogen en gezicht. De dieren na behandeling niet wassen of behandelen met een shampoo en niet direct laten zwemmen. Dit verwijdert de werkzame bestanddelen. Vooral zeewater kan de werkzaamheid en de werkingsduur doen afnemen. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken.



SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ VERWIJDEREN: Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
26 april 2018

OVERIGE INFORMATIE
REG NL 8874

KANALISATIE
VRIJ

Distributeur
EMAX
MEDICAL
www.emax.nl